

Tytuł: Zespół odstawienia u noworodka – matka zażywająca leki lub stosująca używki / Neonatal abstinence syndrome – mother taking medications or stimulants

Słowa kluczowe: MATKA ZAŻYWAJĄCA LEKI W CIAŻY UŻYWKI ZESPÓŁ ODSTAWIENIA U NOWORODKA

Keywords: MOTHER TAKING MEDICATIONS DURING PREGNANCY STIMULANTS NEONATAL ABSTINENCE SYNDROME

Autorzy:

Marek Szczepański - Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Wojciech Szczepański - Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Streszczenie:

Dziecko matki zażywającej w trakcie ciąży leki lub stosującej używki jest po porodzie narażone na wystąpienie zespołu objawów związanych z przerwaniem ekspozycji na te substancje. Jego objawy są różnorodne i mogą sugerować inne, niebezpieczne dla życia noworodka stany, których terapia jest zgoła odmienna. Z tego powodu warto pamiętać o możliwości wystąpienia zespołu odstawienia u noworodka i wiedzieć, jak postępować w takim przypadku. W poniższym artykule omówiono postępowanie z dzieckiem matki zażywającej w trakcie ciąży leki lub stosującej używki.

Abstract:

Children whose mothers used medications or stimulants during pregnancy may develop withdrawal symptoms after birth, as the substances are no longer administered. Symptoms are diverse and may be suggestive of other life-threatening conditions with different treatment protocols. Therefore, caregivers should remember about the possibility of infants developing the newborn abstinence syndrome and they should know the recommended treatment. This paper discusses the appropriate treatment of children whose mothers used pharmaceuticals or stimulants during pregnancy.