

Tytuł: Cewnikowanie pęcherza moczowego u dzieci i młodzieży / Bladder catheterization in children and adolescents

Słowa kluczowe: CEWNIK PĘCHERZ CEWNIKOWANIE

Keywords: BLADDER CATHETER CATHETERIZATION

Autorzy:

Karolina Oskroba - Klinika Urologii Dziecięcej, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”,
Warszawa

Streszczenie:

Cewnikowanie pęcherza moczowego to zabieg polegający na wprowadzeniu cewnika do światła pęcherza moczowego. Procedura ta może być wykonana przezcewkowo lub przez nakłucie przezskórne nadłonowe. Wskazania do cewnikowania pęcherza moczowego dzielimy na diagnostyczne i terapeutyczne.

W zależności od wskazań, spodziewanej długości utrzymywania cewnika w pęcherzu, wywiadu dotyczącego wcześniejszego cewnikowania, przebytych operacji w obrębie pęcherza i cewki moczowej oraz wywiadu w kierunku alergii (lateks) ustalamy, jaki rodzaj cewnika powinien zostać zastosowany w danym przypadku. Wprowadzenie cewnika do pęcherza moczowego wykonujemy w warunkach sterylnych. Czas utrzymywania cewnika w pęcherzu moczowym należy skrócić do minimum. Profilaktyka przeciwbakteryjna stosowana jest od momentu wprowadzenia cewnika do kilku dni po jego usunięciu.

Cewnikowanie – jak każdy zabieg inwazyjny – może prowadzić do powstania powikłań.

Abstract:

Bladder catheterization is a procedure during which a catheter is placed in the bladder. It could be performed via urethra or suprapubic incision. There are therapeutic and diagnostic indications for bladder catheterization. Before catheterization doctor should reevaluate indications and contraindications for this procedure. The type of catheter vary by indications for catheterization, dwell time, earlier catheterization of the bladder, former bladder and urethra operations and latex allergy. Every catheterization is performed in a sterile way. The need for a bladder catheter should be evaluated daily. Antimicrobial therapy is recommended. Complications may occur after every catheterization.